

A. Alexandra's subtractions*Автор: Абдикалыков А.К..*

Вторая максимальная разность равна: $d_2 = \max(a_n - a_2, a_{n-1} - a_1)$.

Асимптотика: $O(n)$.

Замечание: прямой перебор $O(n^2)$ не проходит по ограничениям времени.

B. Book of all the words*Автор: Абдикалыков А.К..*

Перевести число $(k-1)$ в n -ричную систему счисления.

Асимптотика: $O(m)$.

Замечание: прямой перебор $O(n^m)$ не проходит по ограничениям времени.

C. Change the word*Автор: Баев А.Ж..*

Если запретить операцию изменения букв строки на симметричные, то ответ будет:

$$f(s_1, s_2) = \text{len}(s_1) + \text{len}(s_2) - 2 * \text{len}(\text{lcs}(s_1, s_2)),$$

где $\text{len}(a)$ — длина строки a , $\text{lcs}(a, b)$ — наибольшая общая подстрока строк a и b (считается динамическим программированием за $O(\text{len}(a) * \text{len}(b))$).

Если вернуть операцию изменения строк, то ясно, что она применяется не более одного раза. Тогда ответ на задачу:

$$\max(f(s_1, s_2), f(s_1, \bar{s}_2) + 1),$$

где $\bar{s}$ — строка, полученная из строки s заменой всех букв на симметричные.

Асимптотика: $O(\text{len}(s_1)\text{len}(s_2))$.

D. Doubtful numbers*Автор: Абдикалыков А.К..*

Легко понять, что подходят только числа вида pq , где p и q — различные простые числа. Обозначим через $z(n)$ — количество чисел такого вида среди чисел от 1 до n (тогда ответ вычисляется как $z(b) - z(a-1)$). Фиксируем простое p . Подходящих чисел вида pq , где $p < q$ и $pq \leq n$ будет: $\pi\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) - \pi(p)$. Заметим, что перебирать данные p достаточно до $\sqrt{n}$:

$$z(n) = \sum_{p \leq \sqrt{n}} \pi\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) - \pi(p)$$

Решение состоит из 3 частей: построение всех простых от 1 до n ($O(n \log \log n)$ — решето Эратосфена), просчет $\pi(k)$ за $O(n)$ действий и вычисление $z(n)$ за $O(\sqrt{n})$.

Вместо вычисления функции $\pi(n)$ можно вычислить данную сумму с помощью 2 указателей (p — первый указатель,двигающийся от 1 до n , q — второй указатель,двигающийся от n до 1).

Асимптотика: $O(n \log \log n)$.

Замечание 1: решения с асимптотикой $O(n\sqrt{n})$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Замечание 2: решения с неэффективным построением решета (например 2 целочисленных массива размера n) не проходят по ограничениям памяти.

Замечание 3: данную задачу можно решить с асимптотикой $O(\sqrt{n})$, используя подход Генри Лемера для метода Мейсселя.

Е. Experiment with tea*Автор: Баев А.Ж..*

Зафиксируем некоторый уровень воды h . Построим компоненту связности, начиная с нулевой по высоте клетки, на таблице со следующим условием связности: из клетки (i_1, j_1) можно попасть в (i_2, j_2) , если эти клетки соседние по стороне и $a_{i_2 j_2} < h$. Обход можно произвести с помощью алгоритма поиска в ширину или в глубину. При этом, если мы выходим на граничные клетки, то считаем, что обход завершился переполнением. Задача сводится к поиску максимального h , при котором обход не завершается переполнением, что легко решается бинарным поиском по h .

Асимптотика: $O(n^2 \log(h))$.

Замечание: решения с асимптотикой $O(n^2 h)$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Ф. Five words*Автор: Абдикалыков А.К., Баев А.Ж..*

Подсказка 1: «Коровы понимают каждое сказанное человеком слово, правда, только частично».

Подсказка 2: первые буквы каждой строки (КФМГУ).

Ответом является подстрока длины 3 строки: `moscowstateuniversitykazakhstanbranch`.

Г. Glowing letters*Автор: Абдикалыков А.К..*

Для строки длины m без букв 'а' количество подстрок равно

$$\frac{m(m+1)}{2},$$

а количество подпоследовательностей

$$2^m - 1.$$

Пусть буквы 'а' делят исходную строку на подстроки без букв 'а' с длинами $m_1, m_2, \dots, m_k$. Тогда количество подстрок равно

$$\sum_{i=1}^k \frac{m_i(m_i+1)}{2},$$

а количество подпоследовательностей

$$2^{\sum_{i=1}^k m_i} - 1.$$

Асимптотика: $O(n)$.

Замечание 1: решения с асимптотикой $O(n^2)$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Замечание 2: решения с неаккуратным взятием ответа по модулю не проходят некоторые тесты.

Например следующий код дает неверный ответ:

$$ans := (ans + m[i] * m[i+1]) \mod 1000000007.$$

Н. Harmonic permutations*Автор: Абдикалыков А.К..*

Решим эту задачу в общем виде, а именно найдём число $d(s, t)$ перестановок длины $s + t$ таких, что:

1. $a_1 < a_2 < \dots < a_s$;
2. $a_{s+1} < a_{s+2} < \dots < a_{s+t}$;
3. $a_i < a_{s+i}, \forall i = 1, 2, \dots, \min(s, t)$.

Тогда ответом будет число $d(n, n)$.

Чтобы найти $d(s, t)$, определим положение числа $s + t$. Если $s \leq t$, то возможен только один вариант: $a_{s+t} = s + t$. Если $s > t$, то появляется второй вариант $a_s = s + t$. Таким образом определяется рекуррентная формула:

$$d(s, t) = \begin{cases} d(s, t-1) + d(s-1, t), & s > t, \\ d(s, t-1), & s \leq t. \end{cases}$$

Асимптотика: $O(n^2)$.

Замечание 1: решения с асимптотикой $O(n^3)$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Замечание 2: если заметить соответствие строящейся перестановки с правильными скобочными структурами, то можно понять, что ответом будут числа Каталана, соответственно существует решение за $O(n)$.

I. Infinity problem

Автор: Абдикалыков А.К..

Числа с суммой цифр равной 3 представляются в виде: $10^b + 10^c + 10^d$. Сгенерируем все остатки $10^i \bmod n$; их будет не более n штук (для данных ограничений, можно убедиться, что их не более 2000): $rem[t] = 1$, если остаток t был сгенерирован, и $rem[t] = 0$ иначе. Далее достаточно перебрать все возможные остатки t_1 и t_2 , которые сгенерированы и проверить наличие остатка $n - t_1 - t_2$.

Асимптотика: $O(n^2)$.

Замечание 1: решения с асимптотикой $O(n^3)$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Замечание 2: заметим, что при n взаимно простым с 10 число $10^b + 10^c + 10^d$ делится на n только если $10^{b-d} + 10^{c-d} + 1$. Соответственно существует решение за $O(n)$.

J. Jelly cake

Автор: Баев А.Ж..

Легко доказывается, что вершины треугольника с минимальной площадью будут соседними. Поэтому сортируем все точки по их углам φ_i , перебираем все тройки соседних точек и выбираем минимальную. Площадь каждого такого треугольника можно найти по формуле:

$$2R^2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma),$$

где $\alpha = \frac{1}{2}(\varphi_{i+1} - \varphi_i)$, $\beta = \frac{1}{2}(\varphi_{i+2} - \varphi_{i+1})$, $\gamma = \frac{1}{2}(\varphi_{i+2} - \varphi_i)$ и углы φ_i зациклены (то есть $\varphi_{n+k} = \varphi_k$).

Асимптотика: $O(n \log n)$.

Замечание 1: решения с асимптотикой $O(n^2)$ и хуже не проходят по ограничениям времени.

Замечание 2: решение на типе *float* на языке C получает неверный ответ из-за ошибок округления.